

Corvette

Erken gzde
deęiřmeyen
favoriniz !

Yetiřtiricilik Tavsiyeleri

syngenta®

Dikim Öncesi;

- 1-15 Ağustos tarihleri arasında dikimi uygundur.
- Seyrek dikim tavsiye edilir (50 cm sıra üzeri bitki arası veya maximum 2.500 bitki/da).
- Solarizasyon yapılması tavsiye edilir.
- Taban gübrelemesi için tercihen yavaş salımlı gübreler kullanılabilir.
- Dikim esnasında toprağın tavında olmasına dikkat edilmelidir.
- Öğleden sonra serin saatlerde dikim yapılmasına dikkat edilmelidir.

Dikim Sonrası;

- Boş su düşük EC li gübre verilmemelidir.
- Çökerten hastalıklarına önlem amacıyla, damla sulamadan dekara 250 ml Dynasty
- CST125 FS kullanınız.
Arı kullanımı tavsiye edilir.

Gübreleme;

- 1. 2. ve 3. salkımlara kadar ortası yüksek (ürefosfat, 15-30-15, 10-52-10 gibi) gübreler ile çinko, bor, demir, iz element, kalsiyum ve köklendiriciler gibi besin elementleri ve gübre alımını teşvik eden ürünler tavsiye edilir.
- 4. ve 5. salkımlarda dengeli ağırlıklı (18-18-18, 20-20-20 gibi) gübrelemeler ile iz element, demir, kalsiyum, magnezyum ve organik aminoasitli gübreler ile takviye yapılmalıdır.
- 6. ve 7. salkımlarda potasyum ağırlıklı, sonu yüksek (16-8-24, 15-5-30 gibi) gübreleme, Tepe kırmadan itibaren de (20-10-20) gibi gübreler tavsiye edilir.
Not: Tepe kırma üretici ve üretim bölgesine göre 6 ile 7 salkım arasındadır.

Budama;

- İlk 2 salkımda içe bakan yaprakların budanması tavsiye edilir.
Üst salkımlarda yaprak alınması tavsiye edilmez.

Sulama;

- 2. salkımdan sonra damlama boruları bitkiden uzaklaştırılmalıdır.
- Dikimden sonra belirli aralıklarla sifon suyu ve ara sulaması (salma sulama) tavsiye edilir.
- Sıcak dönemlerde küllemeye karşı nem dengesine dikkat edilmelidir.

Not: Sera içi nem 76% altında tüm domates çeşitleri için külleme ve çiçek tutumuna olumsuz etkiler bu yüzden sifon suyu/spreyleme bitki sağlığı için başlangıçta önemlidir.

“ ÜRETİCİLERİMİZE BEREKETLİ BİR SEZON DİLERİZ ”

