

Ruhsat tarih ve no. : 01.04.1996 / 2918

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR :

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi
Domates	Kök Ur Nematodları (<i>Meloidogyne</i> spp)	4 kg / da Fide dikiminden hemen önce veya 1- 2 gün önce uygulanır
Muz	Kök Ur Nematodları (<i>Meloidogyne</i> spp) Spiral Nematod (<i>Helicotylenchus multincinctus</i>)	50 g / Yalak başına Nisan veya Eylül ayında olmak üzere yılda 2 dönemde uygulanır

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ :

Toprak çok iyi bir şekilde işlenmeli ve keseksiz olmalıdır. Tavsiye edilen dozda bitki koruma ürünü , homojen bir şekilde toprağa serilmeli, hemen sonra 10 – 15 cm toprak derinliğine karıştırılmalı ve daha sonra da sulanmalıdır. Toprağa karıştırmada döner kültürler tercih edilmelidir.

Domates - Kök Ur Nematodları: Uygulamada 4 kg / da dozdaki granül ürünün 1 dekara eşit şekilde dağıtılması gerekir. Ürün, toprağın 15-20 cm derinliğine kadar karıştırıldıktan sonra mutlaka sulama yapılmalıdır.

Muz - Kök Ur Nematodları ve Spiral Nematod: Uygulama yalak başına 50 g dozunda, muzların onarım döneminde Nisan ayında bir kez serpilerek yapılır. Aynı dozda ikinci bir uygulama Eylül'de tekrarlanır.

(DİKKAT: Uygulamadan sonra mutlaka sulama yapılmalıdır.)

syngenta

 **Nemathorin® 10G**

Granül (GR)

Grup 1B Nematisit (Nematod ilacı)

% 10 Fosthiazate

Önce etiketi okuyunuz

Evde kullanmayınız

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz

Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz , içmeyiniz, sigara kullanmayınız.

Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Fosthiazate kolinesterazı inhibe eder. Aşırı terleme, baş ağrısı, halsizlik, baygınlık, baş dönmesi, mide bulantısı, mide ağrısı, kusma, gözbebeklerinde küçülme ve kas seğirmesi gibi zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ :

Genel Tavsiyeler : Syngenta acil durum numarasını, zehir danışma merkezini ya da doktoru ararken ya da tıbbi müdahale alacağınız zaman ürün ambalajını, etiketini ya da bu Ürün Güvenlik Bilgi Formu'nu yanınızda bulundurun.

Soluma durumunda : Hastayı açık havaya çıkarın. Hastayı rahat ve sıcak bir yerde tutun. Soluma düzensiz veya durmuşsa suni solunum yapın. Derhal bir doktora veya zehir danışma merkezine ulaşın.

Deri teması durumunda : Derhal ilacın bulaştığı giysileri çıkarın. Temas eden yerleri bol su ile yıkayın. Deri tahriş olmuşsa doktora başvurun. İlacın bulaştığı giysileri tekrar kullanmadan önce yıkayın.

İÇİNDEKİLER:

Fosthiazate

ZARARLILIK İŞARETLERİ :



Uyarı Kelimesi : TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ:

H301 Yutulması halinde toksiktir.

H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın

P260 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/üzü koruyucu kullanın

P301+P310 YUTULDUĞUNDA: ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.

P330 Ağızınızı çalkalayın.

P391 Döküntüleri toplayın.

P501 Kabı uygun bir şekilde bertaraf edin

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyun

EUH208 Fosthiazate ihtiva eder, alerjik reaksiyona neden olabilir.

EUH070 Gözle teması halinde toksiktir.

AMBALAJI AÇMADAN ÖNCE EMNİYET TEDBİRLERİNİ OKUYUNUZ

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

*Suda yaşayan canlılara zehirlidir. Sulama ve dahili işlerde kullanılan suları, akar ve durgun su sahalarını, drenaj sistemlerini atıklarıyla veya hedef dışına sürüklenmesi ile kirlilemeyiniz.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Nemathorin 10 G isimli bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 1B olarak sınıflandırılmış bir nematisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlanan uygulamaları direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için, Nemathorin 10 G' nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 1B harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmaz.



Granül (GR)

Grup	1B	Nematisit (Nematod ilacı)
------	----	-----------------------------

% 10 Fosthiazate

Göze teması durumunda : Derhal gözleri, göz kapakları altını bol su ile 15 dakika boyunca yıkayın. Varsa kontakt lenslerinizi çıkarın. Gerekirse derhal tıbbi yardım alın.

Yutulması durumunda : Yutulması durumunda derhal tıbbi yardım alın ve ürünün ambalajını ya da etiketini doktora gösterin. Hastayı kusturmaya ZORLAMAYIN.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ :

Pralidoxime klorür (2-PAM; Protopam klorür), asetilkolinesteraz'ı yeniden etkinleştirir ve atropine ek olarak etkili olabilir. Yetişkinlerde, 15 ile 20 dakikalık bir süre zarfında, tercihen tuzlu su 100 mL infüzyon halinde 1 ila 2 gram 2-PAM başlangıç dozu enjekte edilir. Bu pratik değilse veya pulmoner ödem varsa, doz 5 dakikadan az olmamak üzere suda% 5'lik bir çözelti olarak intravenöz enjeksiyonla yavaşça verilmelidir. Yaklaşık 1 saat sonra, eğer kas güçsüzlüğü giderilmediyse, ikinci bir 1-2 gramlık bir doz verilecektir. Kas güçsüzlüğü devam ederse, ilave dozlar dikkatli verilmelidir. intravenöz uygulama, mümkün değilse kas içine ya da deri altına enjeksiyon kullanılmalıdır..

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

*Tüm evcil hayvanları uygulama yapılacak sahadan uzak tutunuz.

* Gıda ve yem maddelerini bitki koruma ürünü ile kirlenmeyiniz.

*Kalan fazla ürünü veya kabını usulüne uygun olarak imha ediniz. Ambalajları başka bir gaye için kullanmayınız.

*Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.

DEPOLAMA DURUMU :

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ilaç fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Kullanıcı, imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanır. İmalatçı ürünün uygun olmayan şartlarda muhafazası veya kullanılmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ FİRMA:

ISK Biosciences Europe N.V.
Pegasus Park, De Kleetlaan 12B bus 9, B-1831
Diegem, Belçika

ÜRETİM TESİSİ:

Arysta Life Sciences S.A.S.
Route d'atrix, B.P. 80 64150
Nogueres
Fransa

RUHSAT SAHİBİ FİRMA :

Syngenta Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Mansuroğlu Mah.
Ankara Cad. No. 81
Bayraklı Tower Kat 17
Daire: 109-115
35030 Bayraklı -İZMİR
Tel. : (0232) 413 00 55
Faks: (0232) 435 18 85

®= ISK Biosciences Europe S.A.' nin tescilli ticari markasıdır.