

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR :

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu
Patates	Patateste Kökboğazı Nekrozu ve Siyah Siğil (<i>Rhizoctonia solani</i>)	20 ml / 100 kg tohuma

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Celest Max 100 FS, iyi bir şekilde kalibre edilmek şartıyla tohumlar yürür banattan geçerken memelerden bitki koruma ürünü püskürtülerek ilaçlama yapan aletlerle veya bünyesinde sisleme odası bulunan döner diskli tohum ilaçlama aletleriyle sulandırılmadan veya sulandırılarak kullanılabilir. Uygulamada ayrıca dönen bidon sistemli aletler de kullanılabilir. Üretici şartlarındaki uygulamalarda, beton hazırlama mikserleri, ilaçlama bidonları da kullanılabilir.

Sulandırılarak kullanılmak istendiğinde ön karışımı aşağıdaki şekilde hazırlanmalıdır :

* Bitki Koruma Ürünü karışım kabına aşağıdaki örnekte verilen miktarda su doldurunuz

*Kullanmadan önce bitki koruma ürünü iyice çalkalayınız

*Devamlı olarak karıştırırken gerekli miktarda **Celest Max 100 FS** ' yi suya ilave ediniz.

*Kullanım sona erinceye kadar bu ön karışım devamlı olarak karıştırılmalıdır.

*Bu karışım hazırlandıktan sonra en geç 24 saat içinde kullanılmalıdır. Uygulama yapılan tohum, iyi bir şekilde ekilmeli ve üzeri toprakla örtülmelidir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Uygulama, dikim öncesi tohumluklara uygulanır. Daldırma, sisleme ve püskürtme şeklinde yapılabilir. 100 kg 'lık patates tohumunu ilaçlamak için tavsiye edilen bitki koruma ürünü 1000 ml su ile yukarıdaki şekilde karıştırılarak ön karışım elde edilir. Elde edilen bu ön karışım 100 kg 'lık tohuma belirtilen aletlerle yeknesak olarak uygulanır. Üretici şartlarında, temiz bir zemin üzerine serilmiş tohumluk üzerine sırt pülverizatörü kullanılarak tatbik edilir. Uygulama sırasında tohumluk iyice karıştırılmalı, yumruların iyi bir şekilde ıslanmaları sağlanmalıdır.

syngenta

Celest[®] 100 FS
Max

Tohum İlaçlaması için Akıcı Konsantr (FS)

Grubu	E2 : 12	Fungisit (Mantar ilacı)
-------	---------	---------------------------

100 g/L Fludioxonil

Önce etiketi okuyunuz.

Evde kullanmayınız.

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz , içmeyiniz, sigara kullanmayınız.

Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼ 'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç kez tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Genel Tavsiyeler : Syngenta acil durum numarasını, zehir danışma merkezini ya da doktoru ararken ya da tıbbi müdahale alacağınız zaman ürün ambalajını, etiketini ya da ürün Güvenlik Bilgi Formu' nu yanınızda bulundurun.

Soluma durumunda : Hastayı açık havaya çıkarın. Hastayı rahat ve sıcak bir yerde tutun. Soluma düzensiz veya durmuşsa suni solunum yaptırın.Derhal bir doktora veya zehir danışma merkezine ulaşın.

Deri teması durumunda : Derhal bitki koruma ürününün bulaştığı giysileri çıkarın. Temas eden yerleri bol su ile yıkayın. Deri tahriş olmuşsa doktora başvurun. Ürünün bulaştığı giysileri tekrar kullanmadan önce yıkayın.

İÇİNDEKİLER:

Fludioxonil

ZARARLILIK İŞARETİ



Uyarı Kelimesi : DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı,çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın

P270 Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.

P273 Çevreye verilmesinden kaçınınız

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın

P391 Döküntüleri toplayın.

P501 Kabı uygun bir şekilde bertaraf edin

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyun

AMBALAJI AÇMADAN ÖNCE EMNİYET TEDBİRLERİNİ OKUYUNUZ

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

*Suda yaşayan canlılara zehirlidir.

*Kalan Bitki Koruma Ürünü mahlülünü kuyu, havuz, çeşme yalıkları ve akarsulara dökmeyiniz.

*Sulara bulaştırmaktan kaçınınız.

*Boş Bitki Koruma Ürünü ambalajlarını başka bir gaye için kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.

*Arılara zehirlidir.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ :

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

Bitki tahammülü:

Tavsiye edilen şekilde kullanıldığında **Celest Max 100 FS** tavsiye edildiği bitkilerce iyi bir şekilde tolere edilir. Tereddüt halinde bitki toleransı önceden kontrol edilmelidir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Celest Max 100 FS isimli bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup E2:12 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlanan uygulamaları direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için, Celest Max 100 FS nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (Grup E2:12 harici) Bitki Koruma Ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Nötr reaksiyonlu tohumda kullanılan diğer bitki koruma ürünlerinin "WS" veya "FS" formülasyonlarıyla karışım halinde kullanılmadan önce ön karışım denemesi yapılmalıdır.

syngenta

 Celest® 100 FS
Max

Tohum İlaçlaması için Akıcı Konsantre(FS)

Grubu	E2 : 12	Fungisit (Mantar ilacı)
-------	---------	---------------------------

100 g/L Fludioxonil

Göze teması durumunda : Derhal gözleri, göz kapakları altına bol su ile 15 dakika boyunca yıkayın. Varsa kontakt lenslerinizi çıkarın. Gerekirse derhal tıbbi yardım alın.

Yutulması durumunda : Yutulması durumunda derhal tıbbi yardım alın ve ürünün ambalajını ya da etiketini doktora gösterin. Hastayı kusturmaya ZORLAMAYIN.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ :

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

DEPOLAMA DURUMU :

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında **2** yıl süre ile bitki koruma ürünü fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) bitki koruma ürünleri sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

İlaçlı tohumun muhafazası : İlaçlama yapılmış tohum insan sağlığına zararlıdır. Bu tohumlar bunların ilaçlı olduğu açıkça belirtilen ambalajlarda muhafaza edilmelidir. Bu tohumlar yem ve gıda maddelerinden uzakta saklanmalıdır. İlaçlı tohumlar hayvan yemi veya maddesi olarak kullanılmamalıdır.

FİRMA BEYANI:

Kullanıcı, imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanır. İmalatçı ilacın uygun olmayan şartlarda muhafazası veya kullanılmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ FİRMA:

Syngenta Crop Protection AG
Rosentalstrasse 67 CH-4058
Basel/ İsviçre

ÜRETİM TESİSİ:

SYNGENTA ESPANA S.A.
Campo de Eiro Industrial Situato Parroquia de
Pereiras Municipio de Mos - Pontevedra
LA Relba s/n, 36400 O PORRINO(Pontevedra)
İSPANYA

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

Syngenta Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Halkapınar Mah. 1203/11 Sk.
No: 5-7 İç Kapı No: 62
Konak / İzmir
Tel. : (0232) 413 00 55
Faks: (0232) 435 18 85

(®) Syngenta Şirketler Grubunun tescilli ticari markasıdır.