

KULLANILACIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

| Bitki Adı | Zararlı Organizma Adı | Uygulama Dozu (ml/da) |
|--------------|---|-----------------------|
| Turunçgiller | Horoz ibiği (<i>Amaranthus albus</i>) Domuz pıtrağı (<i>Xanthium strumarium</i>) Semiz otu (<i>Portulaca oleracea</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) | 500 |
| | Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>) | 600 |
| | Aynık (<i>Agropyron repens</i>) Tarla sarmaşığı (<i>Convolvulus arvensis</i>) Topalak (<i>Cyperus rotundus</i>) Ebegümeci (<i>Malva neglecta</i>) | 800 |
| | | |
| Zeytin | Kırmızı köklü tilki kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Boya otu (<i>Chrozophora tinctoria</i>) Demir dikenini (<i>Tribulus terrestris</i>) | 400 |
| | Domuz pıtrağı (<i>Xanthium strumarium</i>) Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>) | 500 |
| | Eşek hıyarı (<i>Ecballium elaterium</i>) | 600 |
| | Köpekdişi ayrığı (<i>Cynodon dactylon</i>) Tarla sarmaşığı (<i>Convolvulus arvensis</i>) | 800 |
| | | |
| Bağ * | Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Domuz pıtrağı (<i>Xanthium strumarium</i>) | 500 |
| | Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>) Kırmızı köklü tilki kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) | 600 |
| | Köpekdişi ayrığı (<i>Cynodon dactylon</i>) Tarla sarmaşığı (<i>Convolvulus arvensis</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) | 800 |
| Elma | Kırmızı köklü tilki kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Eşek marulu (<i>Sonchus asper</i>) Çatal otu (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Çobançantası (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) Demir dikenini (<i>Tribulus terrestris</i>) | 500 |
| | Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>) Köygöçüren (<i>Cirsium arvense</i>) | 600 |
| | Tarla sarmaşığı (<i>Convolvulus arvensis</i>) Tavşanbıyığı (<i>Poa annua</i>) | 800 |

syngenta

TouchdownPremium®

Suda çözünebilen konsantre (SL)

Grubu G,9 Herbisit (Yabancı ot ilacı)

360 g / L Glyphosate asit
(424 g / L glyphosate diammonium tuzu)

Önce etiketi okuyunuz
Evde kullanmayınız
Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz
Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz , içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
Bitki koruma ürünüy uygulananmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.
Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼ 'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç kez tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Mide bulantısı,kusmayla birlikte baş dönmesi ve baş ağrısı görülür.Bu belirtilere ilave olarak ishal de ortaya çıkabilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Genel Tavsiyeler : Syngenta acil durum numarasını, zehir danışma merkezini ya da doktoru ararken ya da tıbbi müdahale alacağınız zaman ürün ambalajını, etiketini ya da ürün Güvenlik Bilgi Formu' nu yanınızda bulundurun.

Soluma durumunda : Hastayı açık havaya çıkarın. Hastayı rahat ve sıcak bir yerde tutun. Soluma düzensiz veya durmuşsa suni solunum yaptırın.Derhal bir doktora veya zehir danışma merkezine ulaşın.

Deri teması durumunda : Derhal bitki koruma ürününün bulaştığı giysileri çıkarın. Temas eden yerleri bol su ile yıkayın. Deri tahriş olmuşsa doktora başvurun. Ürünün bulaştığı giysileri tekrar kullanmadan önce yıkayın.

İÇİNDEKİLER

Glyphosate diammonium

ZARARLILIK İŞARETİ

Uyarı Kelimesi : DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ

H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın
P273 Çevreye verilmesinden kaçının
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/üz koruyucu kullanın
P391 Döküntüleri toplayın.
P501 Kabı uygun bir şekilde bertaraf edin

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyun

AMBALAJI AÇMADAN ÖNCE EMNİYET TEDBİRLERİNİ OKUYUNUZ

KULLANMADAN ÖNCE ÇALAKALAYINIZ

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

*Bitki koruma ürünü gözlerinize zarar verebilir. Gözünüze geldiğinde hemen yıkayınız, ilk yardım tedbirlerine bakınız.
*Uygulama sırasında bitki koruma ürününün bitişikteki ürünlere sürüklenmemesine dikkat ediniz.
*Boş ürün ambalajlarını kesinlikle başka bir gaye için kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.
*Artan mahlülünü kuyu, havuz, çeşme yalıkları ve akarsulara dökmeyiniz, sulara bulaştırmaktan kaçınınız.
*İş elbiselerinizi derhal değiştiriniz ve yıkayınız.
*Bulaşık alet ve ekipmanları sabun veya sodalı su ile yıkayınız.
*Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
*Balıklara zehirlidir.Yer altı ve yer üstü sularına bulaştırmayınız.

| | | |
|---------------|--|--|
| Fındık | Düğünçeği (<i>Ranunculus ficaria</i>) Uzun tavşanbıyığı (<i>Poa trivialis</i>) | 400 |
| | Isırgan otu (<i>Urtica dioica</i>) Labada (<i>Rumex crispus</i>) Gabalak (<i>Arctium lappa</i>) Sinir otu (<i>Plantago major</i>) Eğrelti otu-Kızılot (<i>Pteridium aquilinum</i>) | 500 |
| | Köyğöçüren (<i>Cirsium arvense</i>) Diken (<i>Cirsium vulgare</i>) | 600 |
| | Böğürtlen (<i>Rubus idaeus</i>) | 700 |
| | Köpekdişi ayrığı (<i>Cynodon dactylon</i>) | 800 |
| | Kültür Bitkisi Yetiştirilmeyen Alanlar | Domuz pıtrağı (<i>Xanthium strumarium</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Kırmızı köklü tilki kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) |
| | Semiz otu (<i>Portulaca oleracea</i>) Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>) | 600 |
| | Tarla sarmaşığı (<i>Convolvulus arvensis</i>) Köpekdişi ayrığı (<i>Cynodon dactylon</i>) | 800 |

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

Özellikleri : Touchdown Premium ,sistemik etkili, seçici olmayan, çıkış sonrası uygulanan **glycine** gurubundan bir herbisittir. Hem geniş, hem de dar yapraklı yabancı otlara karşı etkilidir.Yabancı otların yaprakları tarafından alınıp büyüme noktalarına, köklere, rizomlara taşınır. **Touchdown Premium**, uygulandıktan çok kısa süre sonra etkisini gösterir. Yabancı otların gelişmesi durur.Etki belirtisi olan yapraklardaki kızarmalar uygulamadan 4-6 gün sonra görülür. Uygulama sırasında yabancı otların aktif gelişme süreci içinde olmaları etkisini artırır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI :

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

syngenta

TouchdownPremium®

Suda çözünebilir konsantre (SL)

Grubu G:9 Herbisit (Yabancı ot ilacı)

360 g / L Glyphosate asit
(424 g / L glyphosate diammonium tuzu)

Göze teması durumunda : Derhal gözleri, göz kapakları altına bol su ile 15 dakika boyunca yıkayın. Varsa kontakt lenslerinizi çıkarın. Gerekirse derhal tıbbi yardım alın.

Yutulması durumunda : Yutulması durumunda derhal tıbbi yardım alın ve ürünün ambalajını ya da etiketini doktora gösterin. Hastayı kusturmaya ZORLAMAYIN.

ANTİDOTU VE GEREKLİ BİLGİLER: Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır. Mide muhteviyatının nefes borusuna kaçmamasına dikkat edilerek mide yıkanmalıdır. Simptomatik ve takviye edici tedavi uygulanmalıdır

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında **3** yıl süre ile ilaç fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Kullanıcı, imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanır. İmalatçı bitki koruma ürününün uygun olmayan şartlarda muhafazası veya kullanılmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ FİRMA:

Syngenta Crop Protection AG
Rosentalstrasse 67 CH-4058
Basel/ İsviçre

ÜRETİM YERİ:

Syngenta Chemicals B.V.
Rue de Tyberschamps 37
B-7180 Seneffe, Belçika

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

Syngenta Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Halkapınar Mah. 1203/11 Sk.
No: 5-7 İç Kapı No: 62
Konak / İzmir
Tel. : (0232) 413 00 55
Faks: (0232) 435 18 85

®-Syngenta Şirketler Grubunun tescilli ticari markasıdır

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ :

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ :

Açmadan önce bitki koruma ürününü ambalajında iyice çalkalayınız. Dekara kullanılacak su miktarı 25-30 litre kadardır. Yelpaze tipi memeye sahip her türlü uygulama aleti ile kullanılabilir

Touchdown Premium' un en uygun uygulama zamanı, çok yıllık-dar yapraklı yabancı otlar 10-15 cm boyda (4-5 yapraklı) ; çok yıllık-geniş yapraklı yabancı otlar ise çiçeklenme başlangıcında veya çiçeklenme evresinde olduğu zamandır. Tek yıllık-dar ve geniş yapraklı yabancı otlara karşı en uygun uygulama zamanı ise yabancı otlar 5-6 cm boyda veya en az 2 yapraklı evrede olduğu zamandır. **Uygulama sırasında bitki koruma ürününün Turunçgil, Zeytin, Bağ ve Elma bitkilerinin dal ve yapraklarına temas etmemesine , çevredeki kültür bitkilerine sürüklenmemesine büyük özen gösteriniz.** Çiğ varken, rüzgarlı havalarda veya yağış beklenen zamanlarda uyguma yapmayınız. Uygulamadan üç saat sonra yağın yağmurdan etkilenmez.

DİKKAT : Touchdown Premium' u üç yaşından küçük Turunçgil, Zeytin, Bağ, Elma ve Fındık alanlarında kullanmayınız.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Touchdown Premium isimli bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup G:9 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmalarına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlanan uygulamaları direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için, **Touchdown Premium** aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız.Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda farklı etki mekanizmasına sahip (Grup G:9 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

Touchdown Premium, diğer ilaçlarla karıştırılarak kullanılmamalıdır.

DİKKAT : Rezidüel etkili herbisitler **Touchdown Premium** 'dan 7-14 gün önce veya sonra uygulanmalıdır.

syngenta

 **TouchdownPremium®**

Suda çözünebilen konsantre (SL)

| | | |
|--------------|------------|--------------------------------------|
| Grubu | G:9 | Herbisit (Yabancı ot ilacı) |
|--------------|------------|--------------------------------------|

360 g / L Glyphosate asit
(424 g / L glyphosate diammonium tuzu)