

Yaprak leke hastalığı (*Cercospora beticola*)



Amistar®Gold uygulanmış



İlaç uygulanmamış



Kullanıldığı Bitki ve Hastalıklar

Bitki Adı	Hastalık	Kullanma Dozu	Son Uygulama İle Hasat Arasındaki Süre
Şeker pancarı	Yaprak leke hastalığı (<i>Cercospora beticola</i>)	50 ml/da	28 gün

BÖLGE İRTİBAT BİLGİLERİMİZ

GENEL MÜDÜRLÜK

Syngenta Tarım San. ve Tic. A.Ş.
Halkapınar Mahallesi 1203/11 Sokak No:5-7
Megapol Çarşı Kule Kat:6 Daire:62
Konak - İzmir
Tel: 0232 413 00 55

Akdeniz Bölgesi

Fener Mah. Falez Cad. No: 20
Lara - Muratpaşa - Antalya
Tel: 0242 329 11 11

Ege Bölgesi

Halkapınar Mahallesi 1203/11 Sokak No:5-7
Megapol Çarşı Kule Kat:6 Daire:62
Konak - İzmir
Tel: 0232 413 00 55

GAP Bölgesi

Şenevler Mahallesi, Orman Yolu Cad. 6108
Sokak Doğa Park Evleri, A Blok No:13/13
Karaköprü - Şanlıurfa
Tel: 0414 316 57 38

Güney Bölgesi

Yeni Mah. 87071 Sok. Bozkurtlar Rezidans No:52
Kat:12 D:25 01200 Seyhan/Adana
Tel: 0322 332 81 00

İç Anadolu Bölgesi

Tel: 0530 568 25 21

Karadeniz Bölgesi

Tel: 0232 413 00 55

Marmara Bölgesi

Değirmenaltı Mah. Palamut Sokak Seren
Yalı No:4 Süleymanpaşa-Tekirdağ
Tel: 0282 262 04 08

Amistar®Gold

ŞEKER PANCARINDA Dıştan İçe Üstün Koruma



Amistar®Gold

syngenta®

© 2022, Syngenta. Her hakkı saklıdır. Bu yayında yer alan bilgiler tescillidir. Hiçbir surette kopyalanamaz veya çoğaltılamaz. Amistar® Gold Tasarım Çerçevesi, Amaç Simgesi, SYNGENTA markası, SYNGENTA Logosu, Syngenta Grup Şirketlerinden birisinin ticari markasıdır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA HATTI:114
Syngenta bir ZİMİD üyesidir.

- Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanın.
- Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerini okuyunuz.
- Esas olan etiketteki bilgilerdir; resmi tavsiyelere uyunuz.






www.syngenta.com.tr

Syngenta.Türkiye | SyngentaTürkiye | Syngenta TR




Litrede 125 g Azoxystrobin ve 125 g Difenoconazole içeriği ile hem koruyucu hem de tedavi edici bir fungusittir. Bu çift yönlü etki mekanizması geniş spektrumlu hastalık kontrolü sağladığı gibi, hem kontak hem de güçlü bir sistemik etki yaratır.

Uygulama sonrasında bitkinin tüm yeşil aksamından bünyesine alınarak; sistemik özelliği sayesinde eşit bir dağılım gösterir. Ascomycetes, Basidiomycetes, Deuteromycetes ve Oomycetes fungal etmen gruplarına karşı etkilidir. Antisporulant özelliği, hastalığın bitkide yayılmadan, hızlı bir şekilde kontrol edilmesini sağlar.



2017 yılında Bursa ve Eskişehir'deki teknik demo çalışmalarında, Cercospora yaprak leke hastalığına karşı, **Amistar®Gold** yaygın olarak kullanılan mevcut pazar standardı ürüne göre en az **%5 daha iyi** hastalık kontrolü sağlamıştır.

Tüm Hastalık Evrelerinde Üstün Etki!




Yanda bulunan termal ölçümlerde görüldüğü gibi, **Amistar®Gold** rakip ilaca göre bitki içinde çok daha hızlı hareket eder ve homojen bir şekilde tüm yaprağa yayılır. Uç kısımdan sap kısmına kadar yaprak yüzey alanının tamamında üstün bir şekilde koruma sağlar.

Bu şekilde bitki daha uzun süre korunur ve aynı zamanda daha uzun süre yeşil kalır.

1 Gün 3 Gün 7 Gün 10 Gün

1 Gün 3 Gün 7 Gün 10 Gün

Uygulama Aralığı



Cercospora hastalığının başlaması için, %90'ın üzerinde nispi nem, 25°C seviyelerinde gündüz sıcaklığı ve 15°C seviyelerinde gece sıcaklığı yeterlidir. Yaprak yüzeyinde ilk lekeler görüldüğünde ilaçlanmaya başlanmalıdır. Çevresel şartlar hastalık için uygun gittiği sürece, hasada 30 gün kalaya kadar 10-14 gün arayla ilaçlamaya devam etmek gerekebilir.

Özellik	Avantajı	Fayda
Çift etki mekanizması	Yüksek performans ve dayanıklılık yönetimi	Hastalığın tüm evrelerinde güvenilir kontrol
Geniş spektrum	Aynı anda birden fazla pancar yaprak hastalıklarına etkili	Tek ürün ile kolay çözüm
Yıkanmaya dayanıklı	Uzun süreli ve iklimsel koşullardan bağımsız devamlı koruma	Esnek kullanım ve kurtarıcı