

## Kullanıldığı Bitki ve Hastalıklar

Bitki Adı	Hastalık adı	Kullanma dozu ve şekli	Son uygulama ile hasat arasındaki süre (gün)
Pamuk	Fide kök çürüklüğü ( <i>Rhizoctonia solani</i> , <i>Fusarium</i> spp., <i>Phythium</i> spp.)	250 ml/100 kg havsız tohuma	-
Yerfıstığı	Kök boğazı çürüklüğü ( <i>Aspergillus niger</i> )	250 ml/100 kg tohuma	-
Domates (sera)	Toprak kökenli patojenler ( <i>Fusarium</i> spp.)	250 ml/da Damla sulama	10 gün
Biber (sera)	Toprak kökenli patojenler ( <i>Fusarium</i> spp.)	250 ml/da Damla sulama	10 gün
Hıyar (sera)	Toprak kökenli patojenler ( <i>Pythium</i> spp., <i>Rhizoctonia solani</i> , <i>Fusarium</i> spp.)	250 ml/da Damla sulama	28 gün



### BÖLGE İRTİBAT BİLGİLERİMİZ

#### GENEL MÜDÜRLÜK

Syngenta Tarım Saan. ve Tic. A.Ş.  
Halkapınar Mahallesi 1203/11 Sokak No:5-7  
Megapol Çarşı Kule Kat:6 Daire:62  
35170 Konak - İzmir  
Tel: 0232 413 00 55

#### Akdeniz Bölgesi

Fener Mah. Falez Cad. No: 20  
Lara - Muratpaşa - Antalya  
Tel: 0242 329 11 11

#### Ege Bölgesi

Halkapınar Mahallesi 1203/11 Sokak No:5-7  
Megapol Çarşı Kule Kat:6 Daire:62  
Konak - İzmir  
Tel: 0232 413 00 55

#### GAP Bölgesi

Şenevler Mahallesi, Orman Yolu Cad. 6108  
Sokak Doğa Park Evleri, A Blok No:19/13  
Karaköprü - Şanlıurfa  
Tel: 0414 316 57 38

#### Güney Bölgesi

Yeni Mah. 87071 Sok. Bozkurtlar Rezidans  
No:52 Kat:12 D:25 01200 Seyhan Adana  
Tel: 0322 332 81 00

#### İç Anadolu Bölgesi

Tel: 0530 568 25 21

#### Karadeniz Bölgesi

Tel: 0232 413 00 55

#### Marmara Bölgesi

Değirmenaltı Mah. Palamut Sokak Seren  
Yalı No:4 Süleymanpaşa-Tekirdağ  
Tel: 0282 262 04 08

# Dynasty® ile Yarışa Önde Başlayın!



Toprak kökenli funguslara karşı geniş spektrumlu,  
koruyucu, tedavi edici ve uzun süre etkili fungusitiniz



## Yarışa Önde Başlayın!

### Domateste toprak kökenli patojen funguslar

#### Belirtileri:

Fide döneminde çökerten (erime) hastalığına neden olurlar. Daha sonraki gelişme devrelerinde ise solgunluk, kök ve kök boğazında çürümeler, iletim demetlerinde nekrozlar görülür.

#### Mücadelesi:

Uygulama, hastalık belirtileri görülmeden koruyucu olarak yapılmalı, 15 gün arayla tekrarlanmalıdır.


#### Etkili madde ve Oranı:

- Azoxystrobin, 75 g/L
- Metalaxyl-M (Mefenoxam), 37,5 g/L
- Fludioxonil, 12,5 g/L
- **Dynasty® Formülasyon:** Akıcı süspansiyon (FS)

#### Etki mekanizması:


Hem kontak hem de sistemik özelliğiyle Syngenta tarafından geliştirilmiş, bünyesinde üç aktif madde içeren geniş spektrumlu bir fungusittir. Fungal etmen gruplarında başarılı bir kontrol sağlar. Koruyucu, tedavi edici ve uzun süreli etkisi sayesinde hem hastalığın bulaşmasını, yayılmasını engeller hem de hastalıklı bitkilerin tedavi edilmesini sağlar.

#### İçeriğindeki aktif maddelerin özellikleri :




##### Azoxystrobin;

Sistemiktir, koruyucu ve tedavi edicidir, hastalığın tüm dönemlerinde uzun süre etkilidir.



##### Mefenoxam;

Sistemiktir, ksilem ile taşınır hızlı etkilidir, tedavi edicidir.



##### Fludioxonil;

Kontaktır, koruyucudur, spor çimlenmesini engeller, uzun süre etkilidir.




## Fungusların hayat döngüsünde farklı dönemleri etkiler!


### Spor Çimlenmesi



### Enfeksiyon



### Belirtiler



### Koruyucu

### Tedavi edici

### Uzun süre etkili

### Fludioxonil

### Metalaxyl-M

### Azoxystrobin

Yüksek etkili

Az veya etkisiz

## Toprak kökenli hastalıklara karşı koruyucu, tedavi edici ve uzun süre etkilidir.

