

Geniş ve Dar Yapraklı Yabancıtlara Karşı Üstün Koruma

Kullanıldığı Bitkiler ve Kontrol Ettiği Yabancıtlar

Bitki adı	Yabancıtlar	Uygulama dozu
Mısır	Horoz ibiği (<i>Amaranthus albus</i>) Şeytan elması (<i>Datura stramonium</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Domuz pıtrağı (<i>Xanthium strumarium</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Tilki kuyruğu (<i>Alepecurus myosuroides</i>) Kuşotu (<i>Stellaria media</i>) Kırmızı köklü tilki kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Çoban çantası (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) Köpek üzümü (<i>Solanum nigrum</i>) Yabani turp (<i>Raphanus raphanistrum</i>) Tarla düğün çiçeği (<i>Ranunculus arvensis</i>) Karahindiba (<i>Taraxacum officinale</i>)	500 ml/da (Çıkış öncesi)
Ayçiçeği	Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Kırmızı köklü tilki kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Kara pazı (<i>Atriplex spp.</i>) Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>)	400 ml/da (Çıkış Öncesi)
Nohut	Horoz ibiği (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>)	500 ml/da (Çıkış öncesi)
Pamuk	Kırmızı köklü tilki kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Köpek üzümü (<i>Solanum nigrum</i>)	500 ml/da (Çıkış öncesi)
Tatlı Mısır	Horoz ibiği (<i>Amaranthus albus</i>) Şeytan elması (<i>Datura stramonium</i>) Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Domuz pıtrağı (<i>Xanthium strumarium</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Tilki kuyruğu (<i>Alepecurus myosuroides</i>) Kuşotu (<i>Stellaria media</i>) Kırmızı köklü tilki kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Çoban çantası (<i>Capsella-bursa-pastoris</i>) Köpek üzümü (<i>Solanum nigrum</i>) Yabani turp (<i>Raphanus raphanistrum</i>) Tarla düğün çiçeği (<i>Ranunculus arvensis</i>) Karahindiba (<i>Taraxacum officinale</i>)	500 ml/da (Çıkış öncesi)



ERKEN YABANCIOT MÜCADELESİ

BÖLGE İRTİBAT BİLGİLERİMİZ

GENEL MÜDÜRLÜK

Syngenta Tarım San. ve Tic. A.Ş.
Halkapınar Mahallesi 1203/11 Sokak No:5-7
Megapol Çarşı Kule Kat:6 Daire:62
Konak - İzmir
Tel: 0232 413 00 55

Akdeniz Bölgesi

Fener Mah. Falez Cad. No: 20
Lara - Muratpaşa - Antalya
Tel: 0242 329 11 11

Ege Bölgesi

Halkapınar Mahallesi 1203/11 Sokak No:5-7
Megapol Çarşı Kule Kat:6 Daire:62
Konak - İzmir
Tel: 0232 413 00 55

GAP Bölgesi

Şenevler Mahallesi, Orman Yolu Cad. 6108
Sokak Doğa Park Evleri, A Blok No:13/13
Karaköprü - Şanlıurfa
Tel: 0414 316 57 38

Güney Bölgesi

Yeni Mah. 87071 Sok. Bozkurtlar Rezidans No:52
Kat:12 D:25 01200 Seyhan/Adana
Tel: 0322 332 81 00

İç Anadolu Bölgesi

Tel: 0530 568 25 21

Karadeniz Bölgesi

Tel: 0232 413 00 55

Marmara Bölgesi

Değirmenaltı Mah. Palamut Sokak Seren
Yalı No:4 Süleymanpaşa-Tekirdağ
Tel: 0282 262 04 08

Primextra® Opti
500SC

Geniş ve Dar Yapraklı Yabancıtlara Karşı Üstün Koruma



ULUSAL ZEHİR DANIŞMA HATTI:114

Syngenta bir ZİMİD üyesidir.

- Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanın.
- Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerini okuyunuz.
- Esas olan etiketteki bilgilerdir; resmi tavsiyelere uyunuz.



www.syngenta.com.tr

Syngenta.Türkiye | SyngentaTürkiye | Syngenta TR

Primextra® Opti
500SC

syngenta.

Primextra[®]Opti_{500SC}, 2 aktif maddenin eşsiz karışımıyla birçok önemli dar ve geniş yapraklı yabancıotlara karşı üstün kontrol sağlar.

Primextra[®]Opti_{500SC}, Mısır, Ayçiçeği, Nohut, Pamuk, Tatlı Mısır tarlalarında birçok tek yıllık geniş ve dar yapraklı yabancıotların kontrolünde, çıkış öncesi (Pre-Emergence) başarıyla kullanılan sistemik bir yabancıot ilacıdır.


Primextra[®]Opti_{500SC}, gerek ani etkisi gerekse topraktaki uzun süreli etkisi sayesinde geniş bir etki spektrumuna sahiptir.

Primextra[®]Opti_{500SC}, yabancıotun yaprak, sürgün ve kökleri vasıtasıyla bünyesine taşınır.

Primextra[®]Opti_{500SC}, toprak hazırlığı iyi yapılmış, keseksiz ve tavında olduğu koşullarda en yüksek performansını gösterir.

Primextra[®]Opti_{500SC}, ilaç uygulaması düşük basınçta ve toprak herbisitlerine yelpaze hüzmeli meme tipi ile, dekara 20-40 litre su arasında tatbik edilmelidir.

Primextra[®]Opti_{500SC}, uygulanan parseller ile rakip toprak herbisiti kullanılan arazilerde yapılan karşılaştırmada, Primextra Opti'nin %8 daha fazla verim artışı sağladığı kanıtlanmıştır.



En iyi sonuç için 4 önemli adım:

1

Tohum ekiminin, keseksiz ve iyi hazırlanmış toprağa yapılması




3

Doğru ilaçlama;
Yelpaze tipi meme ile, dekara 20-40 litre arasında su düşecek şekilde, rüzgarsız havada ilaçlamanın yapılması




4

- Ekim ile aynı gün yapılacak ilaçlama toprak rutubetinden en iyi şekilde fayda alınmasını sağlar.
- Uygulamadan sonra 15 gün içerisinde alınabilecek metrekareye 15 ila 20 mm arasında yağış, Primextra[®]Opti_{500SC}'nin etkisinin yükselmesini sağlar.



Bitki Bünyesine Alınımı



Bitki Bünyesinde Taşınımı