

Uygulama Şekli:

Tervigo dikim esnasında karık içine veya cansuyu şeklinde dikim yan yüzüne ya da damlama sulama şeklinde toprağa uygulanır. Dikim sonrası cansuyu şeklinde bitki dibine yapılacak olan uygulama ile en yüksek etki sağlanır. Birinci uygulamadan sonra 10-15 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir. Tervigo ile yapılacak uygulamalar öncesinde solarizasyon işleminin yapılması uygulamalardan daha iyi sonuç alınmasına ve toprağın zararlı mikroorganizmalar, toprak kaynaklı hastalık etmenleri ve yabancıot tohumlarından arındırılmasına yardımcı olacaktır.



Performans İçin Geliştirildi

Kullanıldığı Bitkiler ve Kontrol Ettiği Zararlılar

Bitki Adı	Zararlı Adı	Kullanma Dozu	Son uygulama ile hasat arası süre
Domates (sera)	Kök-ur nematodları (<i>Meloidogyne</i> spp.)	200 ml/da dozda 4 uygulama	3 Gün
		400 ml/da dozda 2 uygulama	-
Biber (sera)	Kök-ur nematodları (<i>Meloidogyne</i> spp.)	200 ml/da dozda 4 uygulama	-
Hıyar (sera)	Kök-ur nematodları (<i>Meloidogyne</i> spp.)	200 ml/da dozda 4 uygulama	3 Gün
Kornişon (sera)	Kök-ur nematodları (<i>Meloidogyne</i> spp.)	200 ml/da dozda 4 uygulama	3 Gün



BÖLGE İRTİBAT BİLGİLERİMİZ

GENEL MÜDÜRLÜK

Syngenta Tarım San. ve Tic A.Ş.
Halkapınar Mahallesi 1203/11 Sokak No:5-7
Megapol Çarşısı Kule Kat:6 Daire:62
Konak - İzmir
Tel: 0232 413 00 55

Akdeniz Bölgesi

Fener Mah. Falez Cad. No: 20
Lara - Muratpaşa - Antalya
Tel: 0242 329 11 11

Ege Bölgesi

Halkapınar Mahallesi 1203/11 Sokak No:5-7
Megapol Çarşısı Kule Kat:6 Daire:62
Konak - İzmir
Tel: 0232 413 00 55

GAP Bölgesi

Şenevler Mahallesi, Orman Yolu Cad. 6108
Sokak Doğa Park Evleri, A Blok No:13/13
Karaköprü - Şanlıurfa
Tel: 0414 316 57 38

Güney Bölgesi

Yeni Mah. 87071 Sok. Bozkurtlar Rezidans No:52
Kat:12 D:25 01200 Seyhan/Adana
Tel: 0322 332 81 00

İç Anadolu Bölgesi

Karacıhan Mah. Ankara Cad. Enntepe Mall
Office A Blok Kat:2 Daire:202 Karatay/Konya
Tel: 0530 568 25 21

Karadeniz Bölgesi

Tel: 0232 413 00 55

Marmara Bölgesi

Değirmenaltı Mah. Palamut Sokak Seren
Yalı No:4 Süleymanpaşa-Tekirdağ
Tel: 0282 262 04 08

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA HATTI:114
Syngenta bir ZİMİD üyesidir.

- Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanın.
- Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerini okuyunuz.
- Esas olan etiketteki bilgilerdir; resmi tavsiyelere uyunuz.



www.syngenta.com.tr

[Syngenta.Türkiye](#) | [SyngentaTürkiye](#) | [Syngenta TR](#)

 **Tervigo™ 20SC**

syngenta®

Mükemmel Nematod Kontrolü

✿ Tervigo 20 SC, birçok nematod türüne karşı etkili güçlü bir nematisittir. Tervigo'nun aktif maddesi Abamectin toprakta kontak etki göstermektedir.

✿ Adventif kök gelişimini stimule ettiği için nematodla bulaşık alanlarda sağlıklı ve güçlü kök oluşumu nedeniyle, besin ve su alımının sekteye uğraması engellenmiş olur.

✿ Tervigo, güçlü nematisit etkisiyle farklı nematod türlerini başarı ile kontrol eder ve topraktaki nematod popülasyonunu düşürür.

✿ Buharlaşma özelliği yoktur.

✿ Sistemik değildir; kökler tarafından alınabilir ancak bitki aksamalarına taşınmaz.

Uygulamada Kolaylık ve Esneklik

✿ Tervigo, toprağa uygulandığı için bitkilere olumsuz etki yapmaz ve gelişimlerini etkilemez.


✿ Tervigo, farklı toprak tipleri ve toprak sıcaklıklarında aynı yüksek nematisit etkiyi gösterir.

✿ Tervigo, fideliklerde, viyollerde kullanılabildiği gibi damlama sulama sistemlerinde ya da kökboğazına verilerek doğrudan toprağa uygulanabilir.

✿ Tervigo, üretici tarafından herhangi bir teknik yardıma gerek kalmadan kolayca uygulanabilir.

✿ Tervigo, bitkinin bütün gelişim dönemi boyunca güvenle kullanılabilir.


Bitkinin bütün gelişimi boyunca güvenle kullanılabilir



IPM ve Gıda Güvenliği

✿ Tervigo, IPM programları ile uyumlu olup, faydalı böcekler ve arılar üzerinde olumsuz bir etki göstermez.

✿ Tervigo, sistemik olmadığı ve uygulandığında sadece bitkinin kök bölgesinde bulunduğu için hasat edilen ürünlerde kalıntı problemi yaratmaz.



Korumasız Fideler

Tervigo 20 SC

MÜKEMMEL NEMATOD KONTROLÜ



Sağlıklı kök



Nematodlu kök