

Ruhsat tarih ve no.: 26.02.2010/7575

#### KULLANIM AMACI

Bitki Adı	Etkisi	Kullanma dozu
Buğday	Yatmaya karşı	40 ml / da
Çeltik	Yatmaya karşı	40 ml / da

#### Bitki Koruma Ürününün özellikleri ve etki şekli :

**Palisade 250 EC**, buğdayda yatmayı , çeltikte aşırı boylan -mayı ve yatmayı önleyen bir bitki gelişim düzenleyicisidir (BGD). Bitkiler tarafından esas itibari ile yaprak ve gövde tarafından alınır ve meristematik aktivitenin olduğu alanlara yerleşir , nodül aralanının daralmasını sağlayarak aşırı boylanmayı ve yatmayı önler.

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI :

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptan bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

**KALİBRASYON:** Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

#### UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ :

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ :

**Buğday ve Çeltik:** Kardeşlenme sonu-sapa kalkma başlangıcında uygulanır.

**Kısıtlama :** Kuraklık olduğu zamanlarda, çiğ olduğunda veya yoğun böcek zararı bulunduğu kullanmayınız.

#### Bitki tahammülü:

Tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında, tavsiye edildiği bitkilerce iyi tahammül görür. Tereddüt halinde hassas ve yeni çeşitlerde bitki tahammülü kontrol edilmelidir.



#### Emülsiyon Konsantre (EC)

Grubu	-	Bitki Gelişim Düzenleyicisi
-------	---	-----------------------------

250 g/L Trinexapac-ethyl

- Önce etiketi okuyunuz
  - Evde kullanmayınız
  - Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz
  - Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyin içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
  - Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
  - İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
- TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**
- Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼ üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç kez tekrarlayınız.

#### ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

#### İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

**Genel Tavsiyeler :** Syngenta acil durum numarasını, zehir danışma merkezini ya da doktoru ararken ya da tıbbi müdahale alacağınız zaman ürün ambalajını, etiketini ya da ürün Güvenlik Bilgi Formu' nu yanınızda bulundurun.

**Soluma durumunda :** Hastayı açık havaya çıkarın. Hastayı rahat ve sıcak bir yerde tutun. Soluma düzensiz veya durmuşsa suni solunum yaptırın. Derhal bir doktora veya zehir danışma merkezine ulaşın.

**Deri teması durumunda :** Derhal bitki koruma ürününün bulaştığı giysileri çıkarın. Temas eden yerleri bol su ile yıkayın. Deri tahriş olmuşsa doktora başvurun. Ürünün bulaştığı giysileri tekrar kullanmadan önce yıkayın.

**Göze teması durumunda :** Derhal gözleri, göz kapakları altını bol su ile 15 dakika boyunca yıkayın. Varsa kontakt lenslerinizi çıkarın. Gerekliyse derhal tıbbi yardım alın.

**Yutulması durumunda :** Yutulması durumunda derhal tıbbi yardım alın ve ürünün ambalajını ya da etiketini doktora gösterin. Hastayı kusturmaya ZORLAMAYIN.

#### İÇİNDEKİLER:

Trinexapac-ethyl

#### ZARARLILIK İŞARETLERİ



#### DİKKAT

#### Zararlılık İfadeleri:

H317 Alerjik cilt reaksiyonuna neden olabilir.  
H373 Organlara zarar verebilir (Gastrointestinal sistem) uzun süreli veya tekrarlanan maruz kalma yoluyla.  
H410 Uzun süreli etkilerle sudaki yaşam için çok toksiktir.

#### Önem İfadeleri

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın  
P260 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.  
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.  
P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.  
P362+P364 Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve tekrar kullanmadan önce yıkayın.  
P391 Döküntüleri toplayın.  
P501 Kabı uygun bir şekilde bertaraf edin.

EUH066 Tekrarlanan maruz kalma ciltte kuruluğa veya çatlamaya neden olabilir.  
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyun.

#### KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

\*Kalan ilaç mahlulünü kuyu, havuz, çeşme yalıkları ve akarsulara dökmeyiniz.  
\*Sulara bulaştırmaktan kaçınınız. Balıklara zehirlidir.  
\*Boş ilaç ambalajlarını başka bir gaye için kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.  
\*Yeni ilaçlanan sahada hayvan otlatılmamalı ve evcil hayvanlar buralardan uzak tutulmalıdır.  
\*Arılara zehirlidir.Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.

#### DEPOLAMA DURUMU :

Normal ( serin ve kuru ) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 4 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör ( tolerans ) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

**DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:**

**Palisade 250 EC** isimli Bitki Koruma Ürünü bir Bitki Gelişim Düzenleyicisi (BGD) olduğundan direnç söz konusu değildir.

**KARIŞABİLİRLİK DURUMU:** Diğer bitki korum ürünleri ile karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.

**Emülsiyon Konsantre (EC)**

<b>Grubu</b>	-	<b>Bitki Gelişim Düzenleyicisi</b>
--------------	---	------------------------------------

250 g/L Trinexapac-ethyl

**ANTİDOTU VE TEDAVİSİ :**

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

**ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM ) Tel: 114**

**FİRMA BEYANI:**

Kullanıcı, imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanır. İmalatçı ilacın uygun olmayan şartlarda muhafazası veya kullanılmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

**ÜRETİCİ FİRMA:**

Syngenta Crop Protection AG  
Rosentalstrasse 67  
CH-4058 Basel-İsviçre

**ÜRETİM TESİSİ:**

Chemark ZRT  
06/75 hrsz. H-8182 , Berhida  
Peremarton Gyartelep, MACARİSTAN

**RUHSAT SAHİBİ FİRMA:**

Syngenta Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Halkapınar Mah. 1203/11 Sk.  
No: 5-7 İç Kapı No: 62  
Konak / İzmir  
Tel. : (0232) 413 00 55  
Faks: (0232) 435 18 85

®=Syngenta Şirketler Grubunun tescilli ticari markasıdır.