

# Ampligo® 150 ZC 'ile fındık zararlılarına kaçış yok!

## Kullanıldığı Bitki ve Kontrol Ettiği Zararlılar

Bitki Adı	Zararlı	Doz	Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre
Fındık	Fındık kurdu ( <i>Curculio nucum</i> )	45 ml/100 L su (Ergin)	7 gün
	Fındık dalkıran ( <i>Xyleborus dispar</i> )	40 ml/100 L su (Ergin)	
	Daldelen ( <i>Lymantora coryli</i> )		
	Kahverengi kokarca ( <i>Halyomorpha halys</i> )	60 ml/100 L su (Nimf-Ergin)	
Mısır	Mısır kurdu ( <i>Ostrinia nubilalis</i> )	25 ml / da (Larva)	7 gün
	Mısır koçan kurdu ( <i>Sesamia spp.</i> )		
Antepfıstığı	Antepfıstığı dipkurdu ( <i>Capnodis cariosa</i> )	50 ml / 100 L su (Ergin)	7 gün
	Antepfıstığı dalgüvesi ( <i>Kermania pistaciella</i> )	30 ml / 100 L su (Larva)	
	Antepfıstığı gözkurdu ( <i>Thaumetopoea solitaria</i> )	30 ml / 100 L su (Larva)	
Pamuk	Yeşilkurt ( <i>Helicoverpa armigera</i> )	30 ml / da (Larva)	14 gün
Domates (Tarla)	Yeşilkurt ( <i>Helicoverpa armigera</i> )	40 ml / da (Larva)	3 gün
Yerfıstığı	Yeşilkurt ( <i>Helicoverpa armigera</i> )	30 ml / da (Larva)	14 gün
Patates	Patates böceği ( <i>Leptinotarsa decemlineata</i> )	10 ml / da (Larva)	14 gün
	Patates güvesi ( <i>Phthorimea operculella</i> )	30 ml / da (Larva)	
Mercimek	Mercimek hortumlu böceği ( <i>Sitona crinitus</i> )	50 ml / da (Larva - Ergin)	21 gün
Kiraz	Kiraz dipkurdu ( <i>Capnodis tenebrionis</i> )	50 ml / 100 L su (Ergin)	14 gün
Şekerpancarı	Çizgili yaprakkurdu ( <i>Spodoptera exigua</i> )	30 ml / da (Larva)	21 gün

## BÖLGE İRTİBAT BİLGİLERİMİZ

### GENEL MÜDÜRLÜK

Syngenta Tarım San. ve Tic. A.Ş.  
Halkapınar Mahallesi 1203/11 Sokak No:5-7  
Megapol Çarşısı Kule Kat:6 Daire:62  
Konak - İzmir  
Tel: 0232 413 00 55

### Akdeniz Bölgesi

Fener Mah. Falez Cad. No: 20  
Lara - Muratpaşa - Antalya  
Tel: 0242 329 11 11

### Ege Bölgesi

Halkapınar Mahallesi 1203/11 Sokak No:5-7  
Megapol Çarşısı Kule Kat:6 Daire:62  
Konak - İzmir  
Tel: 0232 413 00 55

### GAP Bölgesi

Şeneler Mahallesi, Orman Yolu Cad. 6108  
Sokak Doğa Park Evleri, A Blok No:19/13  
Karaköprü - Şanlıurfa  
Tel: 0414 316 57 38

### Güney Bölgesi

Yeni Mah. 87071 Sok. Bozkurtlar Rezidans  
No:52 Kat:12 D:25 01200 Seyhan - Adana  
Tel: 0322 332 81 00

### İç Anadolu Bölgesi

Karacıhan Mah. Ankara Cad. Enntepe Mall  
Office A Blok Kat:2 Daire:202 Karatay - Konya  
Tel: 0530 568 25 21

### Karadeniz Bölgesi

Tel: 0232 413 00 55

### Marmara Bölgesi

Yavuz Mahallesi, Şaraphane Cad.  
No:33, Des Ofis, Kat: 2, Ofis No:203,  
Süleymanpaşa 59100 Tekirdağ  
Tel: 0282 261 6400

# Ampligo® 150 ZC fındık zararlılarına kaçış yok!



Ampligo® 150 ZC

syngenta.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA HATTI:114

Syngenta bir ZİMİD üyesidir.

- Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanın.
- Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerini okuyunuz.
- Esas olan etiketteki bilgilerdir; resmi tavsiyelere uyunuz.



www.syngenta.com.tr

Syngenta.Türkiye | SyngentaTurkiye | Syngenta TR

# Ampligo® 150 ZC

## etki mekanizması

### doğrudan etki


Sinir hücrelerinin daha fazla uyarılmasını sağlayarak sodyum (Na<sup>+</sup>) iyonlarının kontrol edilememesine neden olur.



Kaslarda hızlı bir etki ile birlikte felç ve takiben ölüm gerçekleşir.

### uzun etki süresi

Kalsiyum Ca<sup>2+</sup> iyonlarının kontrolsüz salınmasını tetikleyerek, kasların kasılmasına neden olur.



Ani felç ve beslenmenin durması ile hızla zararlı kontrolü sağlanır.

Ampligo® yüksek etkiye sahip çift etki mekanizmalı yeni nesil bir insektisittir. Bisamide ve pyrethroid gibi 2 farklı etki mekanizmasına sahip 2 aktif maddenin karışımı ile hızlı ve uzun süreli etkisi sunar.

Ampligo® içerisinde bulunan Chlorantraniliprole, bir ryanodine reseptör modülatörü olup bu hareketi ile düz ve çizgili kasların dahili depolarındaki kalsiyumun salınımını uyarır ki bu da kas zafiyetine neden olur, sonuçta paralize olan zararlı ölür.

Ampligo® içerisinde bulunan Lambda-cyhalothrin ise sodyum kanal regülatörü bir insektisit olup, zararlının merkezi sinir sistemini bozarak etkiler.

Ampligo®, ani olarak beslenmeyi durdurup uzun süreli etkisi sayesinde zararlı kontrolünde üstün başarı sağlar. İlaçlamalar zararlıların hedef dönemlerinde ve iyi bir kaplama olacak şekilde yapılmalıdır.

## kolay

Üstün formülasyon teknolojisi sayesinde uygulama kolaylığı ve yüksek verim elde etmenizi sağlar.

## güvenilir

Benzersiz ZC (CS+SC) formülasyon teknolojisi ile bitki yüzeyinde sağladığı yüksek kaplama ve güneş ışınlarına (UV) karşı üstün koruma sayesinde zararlılara karşı uzun süre etkilidir.

## farklı

Düşük doz uygulaması ve farklı etki mekanizmasına sahip aktif maddeleri ile dayanıklılık yönetiminde farklılık sağlar.

## Ampligo® ile fındık zararlılarına kaçış yok 150 ZC



Fındık Dalkıran  
(Xyleborus dispar)



Daldelen  
(Lymantor coryli)



Fındık Kurdu  
(Curculio nucum)



Kahverengi kokarca  
(Halyomorpha halys)

Ampligo®  
150 ZC

İlaçlanmış bölgede Ampligo® kapsül içerisinde kalır. Ortamın kurumasıyla birlikte kapsüller farklı zamanlarda birer birer patlayarak etkinliğin uzun süre (ilk günkü gibi) aynı seviyede kalmasını sağlar.



Ampligo®  
150 ZC

syngenta.