

Ruhsat tarih ve no. : 01.06.2017/10899



KULLANILACAGI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki adı	Zararlı organizma adı	Uygulama dozu	Son uygulama ile hasat arasındaki süre
Bağ*	Mildiyö (<i>Plasmopara viticola</i>)	50 g/ 100 L su	21 gün
Domates(sera)	Domates Mildiyösü (<i>Phytophthora infestans</i>)	60 g / 100 L su	3 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

ÖZELLİKLERİ : AMPEXIO, mandelamide sınıfı yeni bir fungusittir. Bileşimindeki **mandipropamid** carboxylic asit amid grubu bir aktif madde olup selüloz sentezlemesiyle hem koruyucu hem de tedavi edici özelliğindedir. Mildiyö gibi önemli ekonomik kayıplara neden olan oomycetes grubu funguslara karşı etkilidir. Spor çimlenmesi üzerinde yüksek bir etkiye sahip olduğu gibi miseliyal gelişimi ve sporulasyonu da etkiler. Ayrıca inkubasyon periyodunda tedavi edici özellik de gösterir. **Zoxamide** ise benzamid grubu bir aktif madde olup b-tubulin birleştiricisi olarak koruyucu özelliğindedir. Bitki yüzeyinde koruyucu bir engel oluşturur ve spor çimlenmelerini engeller.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI :

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptan bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ : Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

Grubu	H5 :40	B3 : 22	Fungisit (Mantar ilacı)
-------	--------	---------	---------------------------

% 25 Mandipropamid + % 24 Zoxamide

Önce etiketi okuyunuz

Evde kullanmayınız

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz

Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz , içmeyiniz, sigara kullanmayınız.

Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ:

Genel Tavsiyeler : Syngenta acil durum numarasını, zehir danışma merkezini ya da doktoru ararken ya da tıbbi müdahale alacağınız zaman ürün ambalajını, etiketini ya da bu Ürün Güvenlik Bilgi Formu'nu yanınızda bulundurun.

Soluma durumunda : Hastayı açık havaya çıkarın. Hastayı rahat ve sıcak bir yerde tutun. Soluma düzensiz veya durmuşsa suni solunum yaptırın.Derhal bir doktora veya zehir danışma merkezine ulaşın.

İÇİNDEKİLER

Mandipropamid
Zoxamide

ZARARLILIK İŞARETİ



Uyarı Kelimesi : **DİKKAT**

ZARARLILIK İFADELERİ

H252 Büyük miktarlarda kendiliğinden ısınır; yangına yol açabilir.
H317 Alerjik cilt reaksiyonuna neden olabilir.
H410 Uzun süreli etkilere sahip su canlıları için çok toksiktir..

ÖNLEM İFADELERİ

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın
P261 Toz solumaktan kaçının.
P273 Çevreye verilmesinden kaçının
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın
P407 Yığınlar veya paletler arasında hava boşluğu bırakın.
P410 Güneş ışığından koruyun.
P391 Döküntüleri toplayın.
P413 1000 kg'dan büyük dökme yükleri 50°C'yi aşmayan sıcaklıklarda depolayın.
P420 Diğer malzemelerden uzakta depolayın.
P501 Kabı uygun bir şekilde bertaraf edin

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyun

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

-Balıklara zehirlidir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ :
Amplexio hakkında bir şikayetiniz olması halinde İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildiriniz.

BAĞ-MİLDİYÖ : Tahmin ve uyarı sisteminin uygulanmadığı yörelerde ; 1. uygulama sürgün boyu 25-30 cm uzunluğa ulaştığında yapılmalı ; 2. ve diğer uygulamalar, günlük sıcaklık, yağış ortalamaları, nispi nem, çiğ gibi meteorolojik koşullar dikkate alınarak hastalık enfeksiyonu için uygun koşullar oluştuğunda yapılmalı, koşullar ortadan kalktığına uygulamalara son verilmelidir. Tahmin ve uyarı sisteminin uygulandığı yörelerde ise uygulamalar için yapılacak uyarılar dikkate alınmalıdır. 1. uygulama, kışık sporla tahmini bulaşmadan sonra ve yazlık sporların ortaya çıkmasından önce (ilk yağ lekeleri görülmeden önce) yapılmalıdır. 2. ve diğer uygulamalara, yapraklar üzerinde en az iki saat ıslaklık olduğu ve yapraklarda yağ lekesi bulunduğu sürece ve bitki koruma ürününün etki süresi olan 14-16 gün aralıklarla devam edilmelidir.

Domates (Sera) – Domates Mildiyösü: Uygulamalara, çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanmalıdır. Her yıl hastalığın görüldüğü ve zarar yaptığı üretim alanlarında ise hastalık belirtileri ortaya çıkmadan önce yapılmalıdır. Hastalığın yoğun olduğu dönemlerde ilaçlamalara 8-10 gün aralıklar ile devam edilmelidir. Bir sezonda en fazla 3 uygulama yapılması önerilir.

Bitki tahammülü :

Tavsiye edildiği şekilde kullanıldığında, **AMPEXIO'** nun tavsiye edildiği ürünler üzerinde herhangi olumsuz bir etkisi yoktur.

Etki şekli farklı 2 aktif maddeden oluştuğundan direnç kazanma riski düşüktür ancak yine de bir sezonda tavsiye edilen ilaçlama sayısı aşılmamalıdır

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

AMPEXIO isimli bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup H5:40 ve B3:22 olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmalarına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlanan uygulamaları direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için, **AMPEXIO'** nun aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (Grup H5:40 ve B3:22 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU : Diğer bitki ürünleri ile karşılaştırılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek duyulursa ön karışım testi yapılmalıdır.



Grubu	H5 :40	B3 : 22	Fungisit (Mantar ilacı)
-------	--------	---------	---------------------------

% 25 Mandipropamid + % 24 Zoxamide

Deri teması durumunda : Derhal ilacın bulaştığı giysileri çıkarın. Temas eden yerleri bol su ile yıkayın. Deri tahriş olmuşsa doktora başvurun. İlacın bulaştığı giysileri tekrar kullanmadan önce yıkayın.

Göze teması durumunda : Derhal gözleri, göz kapakları altını bol su ile 15 dakika boyunca yıkayın. Varsa kontakt lenslerinizi çıkarın. Gerekliyorsa derhal tıbbi yardım alın.

Yutulması durumunda : Yutulması durumunda derhal tıbbi yardım alın ve ürünün ambalajını ya da etiketini doktora gösterin. Hastayı kusturmaya ZORLAMAYIN.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ :

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır **Riskler: Alerjik cilt reaksiyonuna neden olabilir.**

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

- **Aşırı sıcaklıklar ve doğrudan güneş ışığından uzak tutunuz.**

-Sulama ve dahili işlerde kullanılan suları, akar ve durgun su sahalarını, drenaj sistemlerini ilaç atıklarıyla veya ilacın hedef dışına sürüklenmesi ile kirliletmeyiniz.

-**Arlara zehirlidir,çiçeklenme zamanı kullanmayınız.**

DEPOLAMA DURUMU :

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında **3** yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Kullanıcı, imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanır. İmalatçı, ilacın uygun olmayan şartlarda muhafazası veya kullanılmasından doğabilecek zarar konusunda sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ FİRMA:

Syngenta Crop Protection AG
Rosentalstrasse 67 CH-4058
Basel/ İsviçre

ÜRETİM TESİSİ:

Syngenta Production France SAS
55, rue du Fond du Val
27600 Saint.Pierre La Garanne
Fransa

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

Syngenta Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Halkapınar Mah. 1203/11 Sk.
No: 5-7 İç Kapı No: 62
Konak / İzmir
Tel. : (0232) 413 00 55
Faks: (0232) 435 18 85

®-Syngenta Şirketler Grubunun tescilli ticari markasıdır